MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

MONSUR BIOTECH
PVT. LTD.

Agro Chemical Manufacturers

Micro Nutrients | Bio Fertilizers
Pesticides | Fungicides | Herbicides

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

Company Profile

Founded in 2020 **Monsur Biotech Private Limited** set out itself to work extensively with the farming community to help them to harvest better and healthy crops and uplift their livelihood. **Monsur Biotech Private Limited** has established itself as one of the leading names in the Agrochemical Industry. It's Product range spans from Agro Chemicals, Technical & Formulations to Household and Public health Chemicals.

Provide Agro Solutions with high-quality, affordable Agrochemical. Focusing on organic solutions for crop protection, the company is also actively engaged in manufacturing of bio-presticides of different grades. Today **Monsur Biotech Private Limited** has earned the reputation of leading manufacturer for a spectrum of agri-input products, catering across domestic and international markets.

Through extensive research in agricultural fields, the company provides the farming community with successful products, thereby helping them grow healthy crops and optimise their yield.

The organisation works hand in hand with farmers to bring innovation, linear to life. It strives to go beyond nature to ensure that every farmer receives a real increase of the seed sown into the ground as a reward for his virtuous labour, thereby fulfilling its motto of "Uplifting Lives".

Herbicides

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

EZALA *[Pretilachlor 50% E.C.]*

এটি একটি উন্নত মানের নির্বাচনী, বহুমুখী, প্রাক উদ্ভব আগাছানাশক। এটি রোয়া জমিতে যে কোনো রকম ঘাস, জল তৃন বা বড় পাতার আগাছানাশ করতে খুবই কার্যকরী। এই আগাছানাশক প্রয়োগের কোনো বিপরীত প্রভাব ফসলের ওপর পড়ে না, যেমন ফসল জ্বলে যাওয়া বা হলুদ হয়ে যাওয়া।

ফসল : রোপন করা ধান।

প্রয়োগ : ধান রোয়ার ৫ দিনের মধ্যে।

মাত্রা : ৩০০ মিলি / একর।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

[Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG] Megha-71

এটি একটি উন্নত মানের অনির্বাচনী, অর্ন্তবাহী, আগাছা উত্থানের পরে ব্যবহৃত আগাছানাশক। এটি অর্গানো ফসফরাস গ্রুপের অর্ন্তগত। এটি বর্ষজীবী,বহুবর্ষজীবী, চওড়া পাতাযুক্ত বা ঘাসযুক্ত সব রকমের আগাছা নাশে খুবই কার্যকরী। বাজা বা মুথা জাতীয় আগাছা দমনে কার্যকরী।

ফসল : চা ও অন্যান্য ফসল।

প্রয়োগ : জমিতে যদি ফসল থাকে তাহলে ইহা জমির আল বা বাঁধ বরাবর স্প্রে করতে হবে এবং যদি ফসল না থাকে তাহলে আগাছার ওপর সরাসরি স্প্রে করতে হবে।

মাত্রা : ১০০ গ্রাম/১৫ লিটার জলে।

প্যাক : ১০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

Super Power *[Glufosinate Ammonium 13.5% SL]*

সুপার পাওয়ার হল একটি ব্রড-স্পেকট্রাম ভেষজনাশক যা আগাছা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি উন্নতমানের অনির্বাচনী আগাছানাশক। এটি সয়াবিন, ভুট্টা, ক্যানোলা এবং তুলার মতো ফসলে আগাছা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। ইহা সকল প্রকার আগাছার মাটির নিচে থাকা মূলসহ সমূলে আগাছাকে দমন করে। ইহার প্রয়োগে আগাছা সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয় না, ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পুরোপুরি মাটির নিচে থাকা মূলসহ বিনষ্ট হয়।

ফসল : চা ও ফাঁকা জমি।

প্রয়োগ : জমিতে যদি ফসল থাকে তাহলে ইহা জমির আল বা বাঁধ বরাবর স্প্রে করতে হবে এবং যদি ফসল না থাকে তাহলে আগাছার ওপর সরাসরি স্প্রে করতে হবে।

মাত্রা : ১০ মিলি / লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। আগাছাকে সম্পূর্ণ রুপে দমন করতে প্রথমবার স্প্রে করার ২ - ৩ মাস পর এর একবার স্প্রে করতে হবে।

প্যাক : ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।



Herbicides

Glorimon *[Glyphosate 41%]*

ইহা একটি অনির্বাচনী, অর্ন্তবাহী আগাছানাশক। ইহা অর্গানো- ফসফরাস গ্রুপের অর্ন্তগত। ইহা সকল প্রকার আগাছা বিশেষ করে বাজা বা মুথা জাতীয় আগাছা দমনে কার্যকরী। ইহা সকল প্রকার আগাছার মাটির নিচে থাকা মূলসহ সমূলে আগাছাকে দমন করে। ইহার প্রয়োগে আগাছা সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয় না, ১০ -১৫ দিনের মধ্যে পুরোপুরি মাটির নিচে থাকা মূলসহ বিনষ্ট হয়।

ফসল : চা ও ফাঁকা জমি।

প্রয়োগ : জমিতে যদি ফসল থাকে তাহলে ইহা জমির আল বা বাঁধ বরাবর স্প্রে করতে হবে এবং যদি ফসল না থাকে তাহলে আগাছার ওপর সরাসরি স্প্রে করতে হবে।

মাত্রা : ১০ মিলি / লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। আগাছাকে সম্পূর্ণ রুপে দমন করতে প্রথমবার স্প্রে করার ২ - ৩ মাস পর এর একবার স্প্রে করতে হবে।

প্যাক : ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

[Paraquat Dichloride 24% SL] JADU

এটি একটি উন্নত মানের নির্বাচনী, অর্ন্তবাহী, আগাছা উত্থানের পরে ব্যবহৃত আগাছানাশক। এটি অর্গানো ফসফরাস গ্রুপের অর্ন্তগত। এটি বর্ষজীবী, বহুবর্ষজীবী, চওড়া পাতাযুক্ত বা ঘাসযুক্ত সব রকমের আগাছা নাশে খুবই কার্যকরী। বাজা বা মুথা জাতীয় আগাছা দমনে কার্যকরী।

ফসল : চা ও অন্যান্য ফসল।

প্রয়োগ : জমিতে যদি ফসল থাকে তাহলে ইহা জমির আল বা বাঁধ বরাবর স্প্রে করতে হবে এবং যদি ফসল না থাকে তাহলে আগাছার ওপর সরাসরি স্প্রে করতে হবে।

মাত্রা : ১০০ মিলি/১৫ লিটার জলে।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

Insecticides

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.



DORRA [Bifenthrin 10% E.C.]

এটি অর্ন্তবাহী, বহুমুখী, স্পর্শজনিত, পাইরিথ্রয়েড গোষ্ঠীর কীটনাশক। ইহা কীটপতঙ্গের স্নায়ুতন্ত্রের ও সোডিয়াম চ্যানেলের কার্যকারিতা রোধ করে মৃত্যু ঘটায়। ইহা গাছকে সবুজ ও সুস্থ সবল রাখতে এবং উন্নত মানের ফসল ফলাতে সাহায্য করে।

ফসল : ধান ও তুলা।

কীট : সাদামাছি, বলওয়ার্ম, মাঝরা পোকা, সবুজ পাতা ছিদ্রকারী পোকা, বাদামী শোষক পোকা।

মাত্রা : ২০০ - ৩০০ মিলি/একর।

প্রয়োগ : ধান রোপনের ২০-২৫ দিন পর, ১৫ দিন অন্তর।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার।

[Acetamiprid 20% Sp] DUKKA

এটি সর্বাঙ্গবাহী, উদার, বহুমুখী, স্পর্শজনিত নিউওনিকেটিনয়েড কীটনাশক। ইহা পোকার স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে বিষক্রিয়া ঘটার ফলে পোকার হৃদপিন্ড বন্ধ হয়ে যায় ও পোকা মরে যায়। ইহার ট্রান্সলামিনার প্রক্রিয়ার দ্বারা গাছের পাতার নিচে থাকা পোকামাকড়কে দমন করে। ইহা খুব দ্রুত কাজ করে।

ফসল : ধান ও সকল সবজি।

কীট : থ্রিপস, জাবপোকা, সাদামাছি, দইপোকা, নালীপোকা।

মাত্রা : ০.৭৫ - ১গ্রাম/ লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর ২ বার ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : ২০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম ও ১ কেজি।

Five-G [Emamectin Benzoate 5% SG]

ইহা একটি বিশেষ ধরনের কীটনাশক যা পাতার ভিতর প্রবেশ করে একটি বিষের ভান্ডার তৈরী করে। পাতার রস শোষনকারী পোকা যেমন লেপিডপটেরা, হেলিওথিস প্রভৃতি গোত্রীয় পোকা দমনে অত্যন্ত কার্যকরী।

ফসল : তুলা ও ঢেঁড়স।

কীট : তুলার বলওয়ার্ম, শোষক পোকা, মাকড় জাতীয় পোকা, সবুজলেদা, শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা।

মাত্রা : ১৫০-২০০ গ্রাম প্রতি হেক্টর।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর ২ বার।

প্যাক : ১০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

[Thiamethoxam 25% WG] Dotara

এটি সর্বাঙ্গবাহী বহুমুখী কীটনাশক। ইহা স্পর্শজনিত এবং পাকস্থলী ও স্নায়ুতন্ত্রের বিষক্রিয়া মাধ্যমে পোকাকে দমন করে। ইহার বিষক্রিয়া উপকারী বন্ধু পোকার উপর ও দেখা যায়।

ফসল : ধান ও সকল সবজি।

কীট : এফিডস, থ্রিপস, জাবপোকা, সাদামাছি, মাজরাপোকা, ভেঁপুপোকা, লেদাপোকা, সবুজ লেদাপোকা, শোষক পোকা,বাদামি শোষক পোকা।

মাত্রা : ০.৫ গ্রাম/লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১৫-২০দিন অন্তর ২-৩ বার ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : ৫ গ্রাম ও ১ কেজি।

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

Insecticides

Bagha-555 [Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5%EC]

ইহা ক্লোরোপাইফিরস ও সাইপারমেথ্রিন এর সমন্বয়ে তৈরী বহুমুখী স্পর্শজনিত কীটনাশক যা পাকস্থলীর বিষক্রিয়া মাধ্যমে পোকাকে দমন করে। ইহা শোষক পোকা, চোষি পোকা এবং মথ জাতীয় পোকা দমনে খুবই কার্যকরী। ইহা বৃষ্টির জলে মাটি থেকে ধুয়ে যায় না এবং মাটিতে অনেক দিন অবদি সক্রিয় থাকে।

ফসল : ধান, তুলা ও সকল সবজি।

কীট : আমেরিকান বলওয়ার্ম, স্পটেড বলওয়ার্ম, পিঙ্ক বলওয়ার্ম, শোষক পোকা, জাবপোকা, জ্যাসিডস।

মাত্রা : ২৫০-৪০০ মিলি/একর।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার ও ৫ লিটার।

Ratna Super [Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC]

ইহা একটি অনির্বাচনী ও অর্ন্তবাহী কীটনাশক যাহা স্পর্শজনিত ও পাকস্থলীর বিষক্রিয়ার মাধ্যমে পোকাকে দমন করে। ইহা অরগ্যানোফসফেট ও সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক।

ফসল : ধান, তুলা ও সকল সবজি।

কীট : বলওয়ার্ম।

মাত্রা : ২৫০-৪০০ মিলি প্রতি একর।

প্রয়োগ : ১০-১৫ দিন অন্তর পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার ও ৫ লিটার।

Ramda [Lambda Cyhalothrin 5% EC]

এটি একটি পাইরোথ্রিন গ্রুপের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কীটনাশক যা কীট পতঙ্গের শরীরে খুব দ্রুত প্রবেশ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্নায়ুবিক তন্ত্র ব্যাহত করে। ইহা মাটির নিচের এবং ওপরের সবরকম শত্রু কীটপতঙ্গ দমনে কার্যকরী। ইহা কীটের জীবচক্রের যে কোনো পর্যায়ে দমনে কার্যকরী। এটিতে একটি নতুন প্রযুক্তি রয়েছে যার ফলে এটি কীট পতঙ্গ দীর্ঘকালীন নিয়ন্ত্রণ করে।

ফসল : তুলা, ধান, বেগুন, টমেটো।

কীট : বলওয়ার্ম, থ্রিপস, স্টেমবোরার, লেদাপোকা, পাতামোড়া পোকা, সবুজ-শ্যামা পোকা, মাজরা, ভেঁপুপোকা।

মাত্রা : ১-১.৫ মিলি / লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

Dhikkar [Acetamiprid 0.4% + Chloropyriphos 20% EC]

ইহা অরগ্যানোফসফেট গ্রুপের অর্ন্তগত অর্নিবাচনী বহুমুখী স্পর্শজনিত কীটনাশক যা পাকস্থলী ও শ্বাসযন্ত্রের বিষক্রিয়া মাধ্যমে পোকাকে দমন করে। এটি অত্যন্ত কার্যকরী কীটনাশক যা জমিতে ২-৪ মাস অবধি কার্যকরী থাকে। এটি সমস্ত রকম কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের সাথে ব্যবহারের উপযুক্ত।

ফসল : ধান, বাদাম, সরষে, তুলা, কলাই ও বীন ।

কীট : জ্যাসিডস, জাবপোকা, পাতামোড়া পোকা, শুঁয়াপোকা, কান্ডছিদ্রকারী পোকা, সাদামাছি।

মাত্রা : ৫০০-৭০০ মিলি প্রতি একর (ধানের জন্য), ২-২.৫ মিলি / লিটার (অন্যান্য ফসল)।

প্যাক : ১০০ মিলি,২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার ও ৫ লিটার

Insecticides

E-Mida *[Imidacloprid 17.8 SL]*



ইহা বহুমুখী, অর্ন্তবাহী, নিওনিকোনিটয়েড কীটনাশক। ইহা পোকার স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে ঢুকে সংক্রমণ ঘটায় ফলে স্নায়ুতন্ত্র কর্মহীন হয়ে পড়ে ও পোকা মারা যায়। ইহা শোষক পোকার উপর খুব কার্যকরী। ইহা খুব দ্রুত কাজ করে এবং ৮-১০ দিন অবদি কার্যকরী থাকে।

ফসল : ধান, তুলা, লঙ্কা, আম, আখ ও সবজি।

কীট : চোষিপোকা, শোষক পোকা, বাদামী শোষক পোকা, সাদামাছি, এফিডস, থ্রিপস।

মাত্রা : ০.৫-১ মিলি / লিটার জলে।

প্রয়োগ : পোকার প্রাদুর্ভাব হলে ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : ৫০ মিলি, ১০০ মিলি২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

[Cartap Hydrochloride 50% SP] Kuthar SP

এটি একটি অর্ন্তবাহী কীটনাশক যা স্পর্শজনিত ও পাকস্থলী জনিত বিষক্রিয়ার মাধ্যমে কীটকে দমন করে। ইহা সব রকমের কীটপতঙ্গ যেমন কাটুইপোকা, চোষকপোকা, ও শোষকপোকা দমনে কার্যকরী। এটি মানুষ, পশু, পাখি, ফসল, প্রাকৃতিক শত্রুদের প্রতি নিরাপদ, তাই ইহা ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট কন্ট্রোল (IPM)এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

কীট : মাজরা পোকা, লেদা পোকা ও পাতা মোড়া পোকা।

মাত্রা : ০.৫-১ গ্রাম / লিটার জলে।

প্রয়োগ : ধান রোপনের ২৫ দিন পর ও সবজী তে ১৫ দিন অন্তর ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : ২৫ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

Cypermon-10 *[Cypermethrin 10% EC]*

এটি একটি কৃত্রিম পাইরেথ্রয়েড কীটনাশক যা বিশ্বব্যাপী কৃষি এবং গৃহস্থালির কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সংস্পর্শের বিষ এবং পেটের বিষ উভয়ই হিসেবে কাজ করে, পোকামাকড়ের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং পক্ষাঘাত এবং মৃত্যুর কারণ হয়। এটি বিভিন্ন ধরণের পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ এবং কার্যকারিতার জন্য পরিচিত, যার মধ্যে রয়েছে গাছপালা চিবিয়ে খায় এবং চুষে খায় এমন পোকামাকড়।

ফসল : ধান, বাদাম, সরষে, তুলা, কলাই ও বীন ।

কীট : জ্যাসিডস, জাবপোকা, পাতামোড়া পোকা, শুঁয়াপোকা, কান্ডছিদ্রকারী পোকা, সাদামাছি।

মাত্রা : ৫০০-৭০০ মিলি প্রতি একর(ধানের জন্য), ২-২.৫ মিলি / লিটার (অন্যান্য ফসল)।

প্যাক : ১০০ মিলি,২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার ও ৫ লিটার

[Cypermethrin 25%EC] Cypermon-25

এটি একটি কৃত্রিম পাইরেথ্রয়েড কীটনাশক যা বিশ্বব্যাপী কৃষি এবং গৃহস্থালির কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সংস্পর্শের বিষ এবং পেটের বিষ উভয়ই হিসেবে কাজ করে, পোকামাকড়ের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং পক্ষাঘাত এবং মৃত্যুর কারণ হয়। এটি বিভিন্ন ধরণের পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ এবং কার্যকারিতার জন্য পরিচিত, যার মধ্যে রয়েছে গাছপালা চিবিয়ে খায় এবং চুষে খায় এমন পোকামাকড়।

ফসল : ধান, বাদাম, সরষে, তুলা, কলাই ও বীন ।

কীট : জ্যাসিডস, জাবপোকা, পাতামোড়া পোকা, শুঁয়াপোকা, কান্ডছিদ্রকারী পোকা, সাদামাছি।

মাত্রা : ৫০০-৭০০ মিলি প্রতি একর(ধানের জন্য), ২-২.৫ মিলি / লিটার (অন্যান্য ফসল)।

প্যাক : ১০০ মিলি,২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার ও ৫ লিটার

Insecticides

LARIVA [Emamectin Benzoate 1.9% EC]

ইহা একটি বিশেষ ধরনের কীটনাশক যা পাতার ভিতর প্রবেশ করে একটি বিষের ভান্ডার তৈরী করে। পাতার রস শোষনকারী পোকা যেমন লেপিডপটেরা, হেলিওথিস প্রভৃতি গোত্রীয় পোকা দমনে অত্যন্ত কার্যকরী।

ফসল : বেগুন,লঙ্কা, পটল ও সকল সবজি।

কীট : সাদামাছি, জেসিড, থ্রিপস এবং জাবপোকা।

মাত্রা : ১.৫ - ২ মিলি প্রতি লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর ২ বার।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

[Pyriproxyfen 8% + Dinotefuran 5% + Diafenthiuron 18% SC] LEBASTA

ইহা - পাইরিপ্রক্সিফেন, ডায়াফেনথিউরন এবং ডাইনোটেফুরান এই তিনটি সক্রিয় উপাদান বিভিন্ন ধরণের কীটপতঙ্গকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে জ্জ এটি পোকামাকড়ের বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক যা পোকামাকড়ের লার্ভার বিকাশকে ব্যাহত করে, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হতে বাধা দেয়। এটি একটি কীটনাশক এবং অ্যাকারিসাইড যা পোকামাকড় এবং মাইটের স্নায়ুতন্ত্রকে ব্যাহত করে, তাদের কোষে শক্তি উৎপাদনে বাধা দেয়। এটি একটি নিওনিকোটিনয়েড কীটনাশক যা পোকামাকড়ের স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে, অতিরিক্ত উত্তেজনা এবং পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে।

ফসল : বেগুন,লঙ্কা, পটল ও সকল সবজি।

কীট : চোষিপোকা, শোষক পোকা, বাদামী শোষক পোকা, সাদামাছি, এফিডস, থ্রিপস।

মাত্রা : ১.৫ - ২ মিলি প্রতি লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১০-১৫ দিন অন্তর পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

Hellant

ইহা-একটি সিন্থেটিক পাইরেথ্রয়েড কীটনাশক যা কৃষি ফসল, বাগান এবং গৃহস্থালিতে বিভিন্ন পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ এবং ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়। এটি পিঁপড়া, তেলাপোকা, উইপোকা, মাছি, বিছানার পোকা এবং মাছি সহ বিস্তৃত পরিসরের পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে কার্যকর।

প্যাক : ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম ও ৫০০ গ্রাম।

[Carbofuran 3% CG] FIRAN 3G

ফিরান ৩-জি একটি পরিচিত কেমিক্যাল হল কার্বোফুরান। এটি হল স্পর্শক ও পাকস্থলীয় বহুগুন সম্পন্ন কীটনাশক যা পোকা, মাইটস এবং নেমাটোড নির্মূলে সহায়ক। এটি প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ পোকা লাগার আগে। ফিরান ৩-জি প্রয়োগে মাজরা পোকা দমনের পাশাপাশি মাটিতে বসবাসকারী ক্ষতিকারক নেমাটোড সফল ভাবে দমন করে। এতে ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়।

ফসল : ধান, তুলা ও সকল সবজি।

কীট : আমেরিকান বলওয়ার্ম, স্পটেড বলওয়ার্ম, পিঙ্ক বলওয়ার্ম, শোষক পোকা, জাবপোকা, জ্যাসিডস।

মাত্রা : ৮-১০ কেজি/একর।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর।

প্যাক : ১ কেজি।

Insecticides

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

RenZO [Chlorpyriphos 10% GR]

ক্লোরপাইরিফস ১০% জি. আর হল একটি ব্রড-স্পেকট্রাম কীটনাশক, যা দানাদার রূপে পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ১০% ক্লোরপাইরিফস সক্রিয় উপাদান থাকে। এই কীটনাশকটি যোগাযোগ এবং খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে, যা পোকামাকড়ের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে। এটি ধান, ভুট্টা, তুলা, এবং অন্যান্য ফসলের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

কীট : মাজরা পোকা, লেদা পোকা ও পাতা মোড়া পোকা।

মাত্রা : ৮-১০ কেজি/একর।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : ১ কেজি।

[Cartap Hydrochloride 4% GR] Kuthar 4G

কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৪% জি.আর একটি কীটনাশক, যা বিভিন্ন ধরণের ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি সিস্টেমিক কীটনাশক, যা গাছের ভেতরে প্রবেশ করে কাজ করে এবং পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করে। এই কীটনাশকটি সাধারণত ধান, সবজি, এবং অন্যান্য ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয়। এটি সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (IPM) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

কীট : মাজরা পোকা, লেদা পোকা ও পাতা মোড়া পোকা।

মাত্রা : ৮-১০ কেজি/একর।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : ১ কেজি।

HIDIMBA



এটি একটি প্রাকৃতিক ও জৈব কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যা যেকোনো প্রকার ফসলের ক্ষতিকারক ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

কীট : জ্যাসিডস, জাবপোকা, পাতামোড়া পোকা, শুঁয়াপোকা, কান্ডছিদ্রকারী পোকা, সাদামাছি।

মাত্রা : ১-১.৫ মিলি / লিটার জলে।

প্যাক : ৫০ মিলি, ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

TRASMITE

এটি একটি কীটনাশক এবং অ্যাকারিসাইড (একটি কীটনাশক যা বিশেষভাবে মাইট মেরে ফেলে) যা চা, বেগুন, আপেল এবং মরিচের মতো ফসলের বিভিন্ন প্রজাতির মাইট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। এটি মাইটের স্নায়ুতন্ত্রের সাথে হস্তক্ষেপ করে, তাদের বিপাক এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত করে কাজ করে।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

কীট : একটি কীটনাশক যা বিশেষভাবে মাইট মেরে ফেলে।

মাত্রা : ০.৫-১.৫ মিলি / লিটার জলে।

প্রয়োগ : ধান রোপনের ২৫ দিন পর ও সবজী তে ১৫ দিন অন্তর ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : ২৫ মিলি, ৫০ মিলি, ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

Insecticides

PYTHON

এটি একটি প্রাকৃতিক ও জৈব কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যা যেকোনো প্রকার ফসলের ক্ষতিকারক ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী।

ফসল : ধান, বাদাম, সরষে, তুলা, বেগুন, পাট, কলাই ও বীন ।

কীট : কান্ডছিদ্রকারী পোকা, শুঁয়াপোকা, পাতামোড়া পোকা, সাদামাছি, জ্যাসিডস, জাবপোকা।

মাত্রা : ১ মিলি / লিটার জলে।

প্যাক : ৩০ মিলি, ৫০ মিলি, ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

Fungicides

MONGOL

[Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% W.P.]

এটি ডবল সুরক্ষা প্রদানকারী স্পর্শজনিত ও অর্ন্তবাহী ছত্রাক নাশক। ইহা অনেক দিন ধরে সক্রিয় থাকে এবং ছত্রাক ঘটিত রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার এ খুবই কার্যকরী। এটি খুব তাড়াতাড়ি উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত (৩০ মিনিটের মধ্যে) হয়ে যায়, যার ফলে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় না।

ফসল : আঙুর, তামাক, আলু, সরষে, গোলমরিচ, বাজরা, পান, সবজি।

রোগ : জলদী ধ্বসা, নাবি ধ্বসা, টিক্কা রোগ, পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া, গোড়ার, পাতাপচা পাতায় দাগ ইত্যাদি।

মাত্রা : ২-২.৫ গ্রাম / লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১০-১৫ দিন অন্তর ।

প্যাক : ২৫ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

HEXAMON

[Hexaconazole 5% SC]

এটি একটি উচ্চমানের ট্রায়াজোল গ্রুপের অর্ন্তগত অর্ন্তবাহী ও বহুমুখী ছত্রাকনাশক। ইহার এন্টিস্পিরুলিয়ান্ট ও ট্রান্সলামিনার কার্যের মাধ্যমে ছত্রাক ঘটিত রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করতে পারে। এটি উদ্ভিদ কে সবুজ রাখতে সাহায্য করে যার ফলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়। এটি একটি নিরাপদ ছত্রাক নাশক।

ফসল : ধান ও আম।

রোগ : খোলাপচা, গোড়াপচা, ঝলসা, সাদাগুঁড়ো, স্ক্যাব ইত্যাদি।

মাত্রা : ২ মিলি/লিটার জলে।

প্রয়োগ : ধান রোপনের ১৫-২০ দিন পর।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

SAFA

[Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP]

এটি স্পর্শজনিত ও অন্তরবাহী ছত্রাকনাশকের শ্রেষ্ঠ সংমিশ্রণ যা প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক ক্ষমতা সম্পন্ন। ইহার মধ্যে জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ আছে যাহা ফসলের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইহা সমানভাবে পাতার পৃষ্ঠতল বরাবর ছড়িয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ সময় ধরে থেকে যায়।

ফসল : ধান, চীনাবাদাম, পান ও সবজি।

রোগ : আন্থ্রাকনোজ, ঝলসা, পাতার নিচের দাগ, ফলপচা, পাউডারি মিলডিউ, চারার ধ্বসা, টিক্কা রোগ ইত্যাদি।

মাত্রা : ২-২.৫ গ্রাম/লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর, ২ বার।

প্যাক : ২০গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

Fungicides

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

ROSTER TOP *[Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC]*

ইহা একটি বহুমুখী অন্তরবাহী ছত্রাকনাশক। ইহা খুব দ্রুততার সঙ্গে ছত্রাকের জীবানুকে নিমেষে ধ্বংস করে। ইহা ফসলের রোগ প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।

ফসল : ধান, গম, ভুট্টা, বেগুন, টমেটো, লঙ্কা, পটল, আম, পান ইত্যাদি।

রোগ : জলাদি ধ্বসা, নাবি ধ্বসা, খোলা পচা, পাতা পচা, পাতায় দাগ, ঝলসা, ইত্যাদি যাবতীয় ছত্রাক জনিত রোগ।

মাত্রা : ১ মিলি / লিটার জলে।

প্রয়োগ : যে কোনো ফসলের যাবতীয় রোগ দমনের জন্য ১০-১৫ দিন অন্তর রোগের তীব্রতা অনুযায়ী প্রয়োগ করা যায়।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

MOXIMON *[Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP]*

এটি একটি অর্ন্তবাহী, স্পর্শজনিত ,বহুমুখী, মিশ্র ছত্রাক নাশক। ইহা রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়কারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা খুব সহজেই জলে গুলে যায় এবং পাতায় স্প্রে করার পর একটি আস্তরন তৈরী করে ফেলে যার ফলে বাতাসের ভাসমান ছত্রাক আক্রমন করতে পারে না। ইহা খুব দ্রুত গাছের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে ছত্রাকের বৃদ্ধিকে আটকে দেয়। এটি একটি নিরাপদ ছত্রাক নাশক।

ফসল : আঙুর, আলু টমেটো ও লেবু জাতীয় ফল, ধান ও সবজি।

রোগ : ডাউনি মিলডিউ, নাবিধ্বসা ও গামেসিস।

মাত্রা : ২-২.৫ গ্রাম/ লিটার জলে।

প্রয়োগ : প্রথম বার ব্যবহারের ১৪-১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক : ১০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

Monsur M-45 *[Mancozeb 75% WP]*

এটি একটি বহুমুখী, স্পর্শজনিত, প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন কার্যকরী দস্তাঘটিত ছত্রাক নাশক। উন্নত ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট বহু রোগ দমনে কার্যকারী ছত্রাক নাশক। ইহা ফলিয়ার স্প্রে, বীজতলা ভিজানো ও বীজ পরিশোধনে ব্যবহৃত হয়।

ফসল : ধান, জোয়ার, টমেটো, লঙ্কা, পিঁয়াজ, ফুলকপি, বাদাম, পান, ভুট্টা,আলু।

রোগ : ঝলসা, পাতার দাগ, ফলপচা, জলদীধ্বসা ও নাবিধ্বসা, চারাধ্বসা, টিক্কা রোগ ইত্যাদি।

মাত্রা : ৪ গ্রাম/ লিটার জলে।

প্রয়োগ : ৫-১০ দিন অন্তর ।

প্যাক : ১০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

Valid-3 *[Validamycin 3% L]*

এটি একটি অর্ন্তবাহী অ্যান্টিবায়োটিক ছত্রাক নাশক। ইহা যে কোনো কীটনাশক বা ছত্রাক নাশক এর সাথে ব্যবহার করা যায়। ইহা দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরী থাকে কারন ইহা বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় না।

ফসল : ধান।

রোগ : খোলাপচা।

মাত্রা : ৬০০ মিলি / একর।

প্রয়োগ : ১৫-২০ দিন অন্তর।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

Fungicides

KAVTAR [Chlorothalonil 75% W.P.]

এটি একটি অর্ন্তবাহী ও বহুমুখী কার্যকারী ছত্রাকনাশক। ইহা উদ্ভিদের পাতা ও শিকড় দ্বারা খুব দ্রুত শোষিত হয় এবং জাইলেম দ্বারা সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ইহা জমিতে দীর্ঘ সময় ধরে থেকে যায় ফলে অনেক দিন অবধি ফসলকে রোগ থেকে রক্ষা করে।

ফসল : ধান, ফল ও সমস্ত সবজী।

রোগ : গমের পাতা ও কান্ডের মরিচা রোগ, ধানের খোলা পচা রোগ, চায়ের ব্লিস্টার ব্লাইট, চিনাবাদামের পাতায় দাগ ও মরিচা রোগ।

মাত্রা : ১-১.৫ গ্রাম / লিটার জলে।

প্রয়োগ : রোপনের ৫০ দিন পর।

প্যাক : ১০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

[Hexaconazole 5% + Validamycin 2.5% SC] DHRUBA

এটি ডবল সুরক্ষা প্রদানকারী স্পর্শজনিত ও অর্ন্তবাহী ছত্রাক নাশক। ইহা অনেক দিন ধরে সক্রিয় থাকে এবং ছত্রাক ঘটিত রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার এ খুবই কার্যকরী। এটি খুব তাড়াতাড়ি উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত (৩০ মিনিটের মধ্যে) হয়ে যায়, যার ফলে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় না।

ফসল : আঙুর, তামাক, আলু, সরষে, গোলমরিচ, বাজরা, পান, সবজি।

রোগ : জলদী ধ্বসা, নাবি ধ্বসা, টিক্কা রোগ, পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া, গোড়ার, পাতাপচা পাতায় দাগ ইত্যাদি।

মাত্রা : ২-২.৫ মিলি / লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১০-১৫ দিন অন্তর ।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

Micro Nutrients

ZIMBO [Zinc, Iron, Molybdenum, Boron & Copper]

ইহা হল এক ধরনের উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান যা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি জিঙ্ককে এমন একটি রূপে আবদ্ধ করে যা গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে, এটি জিঙ্কের ঘাটতি দ্রুত পূরণ করতে এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়ক।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

মাত্রা : ১ গ্রাম / লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর।

প্যাক : ২৫ গ্রাম, ১০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

CHIPKU

চিপ্‌কু- একটি প্রমাণিত পিএইচ ব্যালেন্সার, নন-আয়নিক, জৈব, সিলিকন-ভিত্তিক সুপার স্টিকার স্প্রেডার এবং সমস্ত কৃষি ব্যবহারের জন্য রেইন ফাস্টেনার।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

মাত্রা : ১ মিলি / লিটার জলে।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

Micro Nutrients

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

VITA -M GR

এটি একটি প্রাকৃতিক জৈব অ্যাসিড যা উদ্ভিদের পুষ্টি গ্রহণ এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়ক। এটি উদ্ভিদের শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান (যেমন নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম) শোষণে সাহায্য করে এবং এগুলোকে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। এটি মাটির গঠন এবং উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা উদ্ভিদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। এটি উদ্ভিদের শুষ্কতা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে, সেই সাথে ফসলের ফলন এবং গুণমান উন্নত করে।

ফসল : ধান, জোয়ার, টমেটো, লঙ্কা, পিঁয়াজ, ফুলকপি, বাদাম, পান, ভুট্টা,আলু।

মাত্রা : ১-১.৫ কেজি / বিঘা।

প্যাক : ১ কেজি ও ১০ কেজি।

BHOMRA

প্রাথমিকভাবে কোষের প্রসারণ এবং বিভাজনকে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে এটি মূলের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে এবং ফলের আকার বৃদ্ধি করে বলে জানা যায়। BHOMRA যখন জৈব উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন প্রোটিন সংশ্লেষণ এবং ক্লোরোফিল উৎপাদনে সহায়তা করে এই প্রভাবগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটির ব্যবহারে ফলন বৃদ্ধি পেতে পারে, ফলের গুণমান উন্নত হতে পারে এবং পরিবেশগত চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

ফসল : সমস্ত সবজী।

মাত্রা : ১-২ মিলি / লিটার জলে।

প্যাক : ১৫ মিলি, ৩০ মিলি, ৫০ মিলি ও ১০০ মিলি।

BRIDDHI GOLD

এটি একটি প্রাকৃতিক জৈব অ্যাসিড যা উদ্ভিদের পুষ্টি গ্রহণ এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়ক। এটি উদ্ভিদের শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান (যেমন নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম) শোষণে সাহায্য করে এবং এগুলোকে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। এটি মাটির গঠন এবং উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা উদ্ভিদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। এটি উদ্ভিদের শুষ্কতা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে, সেই সাথে ফসলের ফলন এবং গুণমান উন্নত করে।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

মাত্রা : ১০ কেজি প্রতি একর।

প্যাক : ১০ কেজি।

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

Micro Nutrients

BRIDDHI SUPER

এটি একটি প্রাকৃতিক জৈব অ্যাসিড যা উদ্ভিদের পুষ্টি গ্রহণ এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়ক। এটি উদ্ভিদের শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান (যেমন নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম) শোষণে সাহায্য করে এবং এগুলোকে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। এটি মাটির গঠন এবং উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা উদ্ভিদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। এটি উদ্ভিদের শুষ্কতা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে, সেই সাথে ফসলের ফলন এবং গুণমান উন্নত করে।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

মাত্রা : ১০ কেজি প্রতি একর।

প্যাক : ১০ কেজি।

[Chelated Zinc 12%] ZIKOMO

এটি হল এক ধরনের উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান যা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি জিঙ্ককে এমন একটি রূপে আবদ্ধ করে যা গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে, এটি জিঙ্কের ঘাটতি দ্রুত পূরণ করতে এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়ক।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

মাত্রা : ০.১ গ্রাম/ লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১০-১৫ দিন অন্তর পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

প্যাক : ১ কেজি।

MOZEJA

এটি একটি প্রাকৃতিক জৈব অ্যাসিড যা উদ্ভিদের পুষ্টি গ্রহণ এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়ক। এটি উদ্ভিদের শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান (যেমন নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম) শোষণে সাহায্য করে এবং এগুলোকে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। এটি মাটির গঠন এবং উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা উদ্ভিদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। এটি উদ্ভিদের শুষ্কতা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে, সেই সাথে ফসলের ফলন এবং গুণমান উন্নত করে।

ফসল : ধান, জোয়ার, টমেটো, লঙ্কা, পিঁয়াজ, ফুলকপি, বাদাম, পান, ভুট্টা,আলু।

মাত্রা : ০.৫-১ গ্রাম/ লিটার জলে।

প্যাক : ১০ গ্রাম, ১৫ গ্রাম, ১০০ গ্রাম ও ১ কেজি।

ROYAL ZINC 33%

এটি হল এক ধরনের উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান যা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি জিঙ্ককে এমন একটি রূপে আবদ্ধ করে যা গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে, এটি জিঙ্কের ঘাটতি দ্রুত পূরণ করতে এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়ক।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর।

প্যাক : ১ কেজি।

Micro Nutrients

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

TULKUN

এটি একটি প্রাকৃতিক জৈব অ্যাসিড যা উদ্ভিদের পুষ্টি গ্রহণ এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়ক। এটি উদ্ভিদের শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান (যেমন নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম) শোষণে সাহায্য করে এবং এগুলোকে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। এটি মাটির গঠন এবং উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা উদ্ভিদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। এটি উদ্ভিদের শুষ্কতা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে, সেই সাথে ফসলের ফলন এবং গুণমান উন্নত করে।

ফসল : সমস্ত সবজী।

মাত্রা : ৩ মিলি / লিটার জলে।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

HUMON-98

এটি একটি প্রাকৃতিক জৈব অ্যাসিড যা উদ্ভিদের পুষ্টি গ্রহণ এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়ক। এটি উদ্ভিদের শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান (যেমন নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম) শোষণে সাহায্য করে এবং এগুলোকে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। এটি মাটির গঠন এবং উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা উদ্ভিদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে। এটি উদ্ভিদের শুষ্কতা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে, সেই সাথে ফসলের ফলন এবং গুণমান উন্নত করে।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

মাত্রা : ০.৫-১ গ্রাম/ লিটার জলে।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর।

প্যাক : ১ কেজি।

MOONFLOWER *[Nitrobenzene 36% V/V]*

এটি হল একটি উদ্ভিদ বৃদ্ধি উদ্দীপক যা প্রায়শই কৃষিতে ফুল ফোটানো, ফল ধরা এবং সামগ্রিক উদ্ভিদের স্বাস্থ্য উন্নত করতে ব্যবহৃত হয় । এটি ফসলের ফলন বৃদ্ধি, উদ্ভিদ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং ফসলের মান উন্নত করার জন্য পরিচিত। এটি মূলের বিকাশ এবং সামগ্রিক উদ্ভিদের আকারকে উদ্দীপিত করে উদ্ভিদ বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে নাইট্রোবেনজিন গাছপালাকে খরার মতো পরিবেশগত চাপ সহ্য করতে সাহায্য করতে পারে।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

মাত্রা : ৩ মিলি প্রতি একর।

প্রয়োগ : ১০-১৫ দিন অন্তর পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

প্যাক : ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি ও ১ লিটার।

SAHI ZINC 21%

এটি হল এক ধরনের উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান যা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি জিঙ্ককে এমন একটি রূপে আবদ্ধ করে যা গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। এই কারণে, এটি জিঙ্কের ঘাটতি দ্রুত পূরণ করতে এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়ক।

ফসল : ধান ও সমস্ত সবজী।

প্রয়োগ : ১৫ দিন অন্তর।

প্যাক : ১ কেজি।

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

Our Product Range

MONSUR
BIOTECH PVT. LTD.

MONSUR BIOTECH PVT. LTD.

AN ISO 9001 - 2015 CERTIFIED COMPANY

Wari, Newtown, Kolkata 700135